

婦人科がんレジメン

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
00GYN43	wCDDP short (1回分) 外来06子宮頸癌	RTに同時併用 8週以内に計5回施行	高度催吐性リスク	1	6	シスプラチン点滴静注:40mg/m <sup>2</sup> Day1
01GYN21	TC (PTX/CBDCA) (3週毎) 外来06卵巣・子宮癌	短時間投与 3週毎	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
04GYN48	dd-TC(PTX/CBDCA) (3週毎) 1回-1回 外来06卵巣癌	PTX80mg/m <sup>2</sup> :day1,8,15 CBDCA:day1の1回-1回 (2回-1回目は別レジメン)	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	15	6	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
05GYN49	dd-TC(PTX/CBDCA) (3週毎) 2回-1回以降 外来06卵巣癌	PTX80mg/m <sup>2</sup> :day1,8,15 CBDCA:day1の2回-1回以降 1回-1回目は別レジメン	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	15	6	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
11GYN02	DC (DOC/CBDCA) (3週毎) 外来06卵巣・子宮癌	3週毎	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	ドセタキセル点滴静注:70mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
12GYN23	PLD/CBDCA (CLD) (4週毎) 外来06卵巣癌	4週毎	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	27	ドキシル注:30mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注:AUC5 Day1
13GYN26	GEM/CBDCA (2投1休) 外来06卵巣癌	GEM : day1,8 CBDCA : day1 (2投1休) 最大10ヶル	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	8	13	ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注:AUC4 Day1
14GYN41	CDDP/CPT11(day1)short 外来06子宮頸癌、卵巣癌	3週毎のday1のみ day8,15は別レジメン	高度催吐性リスク	1	6	イリノテカン塩酸塩点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1
15GYN20	CPT11のみ (day8,15) 60mg/m <sup>2</sup> (1回分) 外来06卵巣癌	(CDDP/CPT-11) 3投1休のCPT-11 1回分 7日目休薬完了	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	6	イリノテカン塩酸塩点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1
21GYN06	PLD (4週毎) 外来06卵巣癌	4週ごと	軽度催吐性リスク	1	27	ドキシル注:40mg/m <sup>2</sup> Day1
23GYN17	GEM (day1) (1回分) 外来06卵巣癌	卵巣癌 GEM単剤 3投1休の1回分 7日目休薬完了	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1
25GYN19	CPT11 (day1) (1回分) 外来06卵巣癌	CPT-11単剤 3投1休の1回分 7日目休薬完了	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	6	イリノテカン塩酸塩点滴静注:100mg/m <sup>2</sup> Day1
26GYN27	Nogitecan (3週毎d1-5) 外来06卵巣癌	ルカムチン : d1-5, 3週毎	軽度催吐性リスク	5	16	ハイカムチン注射用:1.2mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
27GYN38	weekly PTX (1回分) 外来06卵巣癌	3投1休 (レジメンは1回分のみ)	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1
31GYN42	AP short (ADM/CDDP) (3週毎) 外来03子宮体癌	day1 : ADM (60mg/m <sup>2</sup> ), CDDP(50mg/m <sup>2</sup> )、最大8ヶル	高度催吐性リスク	1	20	ドキソルビシン塩酸塩注射用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:50mg/m <sup>2</sup> Day1
32GYN09	DOC/GEM (day1 GEMのみ) 外来06子宮癌	子宮体癌 DOC/GEM day1のみ 7日目休薬完了	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用 :800mg/m <sup>2</sup> Day1

33GYN10	DOC/GEM (day8) 外来06子宮癌	子宮体癌 day8のみ 14日目休 薬完了	軽度催吐性リスク	1	13	ゲムシタピン点滴静注用:800mg/m <sup>2</sup> Day1 ドセタキセル点滴静注液:70mg/m <sup>2</sup> Day1
35GYN32	ADM (3週毎) 外来06子宮体癌	3週毎 最大8回 薬剤抵抗性の 子宮体癌再発	高度催吐性リスク	1	20	ドキソルビシン塩酸塩注射液:60mg/m <sup>2</sup> Day1
41GYN47	NGT/CDDP入外共通06子宮頸癌 (3週毎)	NGT : day1-3(0.75mg/m <sup>2</sup> ) CDDP : day1(50mg/m <sup>2</sup> ) 最大 8回	高度催吐性リスク	3	18	ハイカムチン注射液:0.75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注:50mg/m <sup>2</sup> Day1
51GYN35	Bv+TC (3週毎) 外来06卵巣・卵管・腹膜癌	最大10回 術後2回目から、再 発の場合は1回目から。StageⅢ 以上/薬剤感受性再発。	中等度催吐性リスク (特定 薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
52GYN46	Bv+PLD (4週毎) 外来06卵巣癌	4週ごと	軽度催吐性リスク	1	27	ドキシル注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
53GYN40	Bv+GEM(3週毎)外来06卵巣癌	day1 : ペバシズマブ、ゲムシタ ピン投与、day8 : ゲムシタピン 投与	軽度催吐性リスク	8	13	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
54GYN45	Bv+weekly PTX (4週毎) 外来06卵巣癌	d1,8,15:PTX d1:Bv 4週毎	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
60GYN36	Bv (3週毎) 外来06卵巣・卵管・腹膜癌	最大16回 StageⅢ以上/薬剤 感受性再発の卵巣・卵管・腹膜癌 (Bv+TC終了後)	最小度催吐性リスク	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
72GYN30	BEP (day9) 外来06胚細胞腫瘍 (卵巣)	3週毎 day1-5,16は別日	最小度催吐性リスク	1	6	プレオ注射液:20mg/m <sup>2</sup> Day1
73GYN31	BEP (day16) 外来06胚細胞腫瘍 (卵巣)	3週毎 day1-5,9は別日	最小度催吐性リスク	1	5	プレオ注射液:20mg/m <sup>2</sup> Day1
81GYN33	ACT-D (day1-5) (2週毎) 外来06絨毛性疾患	day1-5連日投与 2週毎 最大10 クール	中等度催吐性リスク	5	9	コスメゲン:0.01mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
GYN05	CPT11 (CPT11/CBDCAのday8) 外来06卵巣癌	最大10クール (CPT-11/CBDCA) のday8のみ 3週毎 (休薬完了 日: day14) day1は別日	中等度催吐性リスク (特定 薬剤)	1	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1
GYN52	ハラヴェン (2投1休) 外来04子宮悪性軟部腫瘍	3週毎 (day1,8投与) 化学療法 歴のある子宮悪性軟部腫瘍 PDま で	軽度催吐性リスク	8	13	ハラヴェン静注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
GYN53	ハラヴェン (1回分) 外来04子宮悪性軟部腫瘍	入院初回1回分 化学療法歴のあ る子宮悪性軟部腫瘍	軽度催吐性リスク	1	6	ハラヴェン静注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1
GYN54	CBDCA単剤(3週毎)外来06卵巣・子宮体・子宮頸 癌	頸Ca、体Ca、卵巣Ca 3週毎	中等度催吐性リスク	1	20	カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
GYN55	Bv/Olaparib (3週毎) 外来06卵巣癌	最大20回 HRDを有する卵巣癌 におけるBevを含む初回化学療法 後の維持療法 オパリア® 1回300mg 1日2回 (連日内服)	最小度催吐性リスク	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
GYN57a	【3週毎】レバチン® + アムスチン® 200mg 外来06 子宮体癌	レバチン® 20mg/day連日内服、ア ムスチン® 200mg/body 3週 毎	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
GYN57b	【6週毎】レバチン® + アムスチン® 400mg 外来06 子宮体癌	レバチン® 20mg/day連日内服、ア ムスチン® 400mg/body 6週 毎	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1

GYN59	TC (PTX/CBDCA) +Pembro(3週毎)外来06子宮頸癌	子宮頸癌 3週毎	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1
GYN61	TC+Pembro+Bev (3週毎) 外来06子宮頸癌	Pembro200mg/body、 PTX175mg/m <sup>2</sup> 、CBDCA : AUC=5、Bev15mg/kg 3週ごと と 最大8コース (PDまで)	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
GYN63	Cemiplimab療法 外来06子宮頸癌	がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌 Cemiplimab : 350mg/body 3週ごと	最小度催吐性リスク	1	20	リプタヨ点滴静注:350mg Day1
GYN65	【3週毎】 <sup>レムバ</sup> 200mg 【維持】 外来06子宮頸癌	<sup>レムバ</sup> 200mg/body 3週毎 TC+Pembro,TP+Pembro療法後の維持療法 (最大35コース)	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
GYN66	【6週毎】 <sup>レムバ</sup> 400mg 【維持】 外来06子宮頸癌	<sup>レムバ</sup> 400mg/body 6週毎 TC+Pembro,TP+Pembro療法後の維持療法 (最大15コース)	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
GYN67	Pembro+Bev 【維持】 (3週毎) 外来06子宮頸癌	Pembro200mg/body、 Bev15mg/kg 3週ごと TC+Pembro+Bev療法後の維持療法 (最大35コース)	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
GYN68	TC+Bev【アバスチン】 (3週毎) 外来06子宮頸癌	PTX175mg/m <sup>2</sup> 、CBDCA : AUC=5、Bev15mg/kg 3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1