

その他・原発不明レジメン

| 当院コード | レジメン名 | コメント | 催吐性リスク | 投与期間 | コース期間 | 薬剤情報 薬品名：数量 投与日 |
|--------|---|---|------------------|------|-------|---|
| IN046 | wCPT11 (3投1休) 外来12原発不明癌 | 3投1休 | 中等度催吐性リスク (特定薬剤) | 15 | 13 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 |
| IN237 | Pembrolizumab 200mg 3週毎 入外共通12MSI-High固形癌 | Pembrolizumab 200mg/body 3週毎 | 最小度催吐性リスク | 1 | 20 | キイトルーダ点滴:200mg Day1 |
| IN237b | Pembrolizumab 400mg 6週毎 外来12MSI-High固形癌 | Pembrolizumab 400mg/body 6週毎 | 最小度催吐性リスク | 1 | 41 | キイトルーダ点滴静注100mg4mL:400mg Day1 |
| IN338 | PTX/GEM (1回分) 外来12胚細胞腫瘍 | PTX : day1,8,15/GEM : day1,8,15投与(3投1休)。2ヶ-ル目からテ"オメタ"減量可。 | 軽度催吐性リスク | 1 | 6 | ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m ² Day1 バクリタキセル注射液:100mg/m ² Day1 |