

肺がんレジメン

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
IN001	GEM/CBDCA(2投1休)外来03NSCLC	day1,8:GEM、day1:CBDC 3週毎 6サイクル	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	8	13	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注用:AUC5 Day1
IN025	PTX/CBDCA(3投1休)外来03NSCLC	day1,8,15:PTX、day1:CBDC 28日目休薬完了	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	15	13	パクリタキセル注射液:70mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注用:AUC5 Day1
IN026	Docetaxel(3週毎)外来03NSCLC	3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1
IN027	CPT11/CDDP(80)(3投1休)外来03NSCLC	day1,8,15:CPT11、day1:CDDP 28日目休薬完了	高度催吐性リスク	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注用:80mg/m <sup>2</sup> Day1
IN028	CPT11(3投1休)外来03NSCLC・NSCLC	SCLC NSCLCに対する化学療法	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
IN029	DTX/CDDP(3週毎)外来03NSCLC	進行NSCLC、3週毎	高度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注用:80mg/m <sup>2</sup> Day1
IN030	VNR(3投1休)外来03NSCLC	3投1休 最大6コース	軽度催吐性リスク	15	13	ロゼウス静注用:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
IN031	weeklyPTX(3投1休)外来03NSCLC	3投1休	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
IN032	PTX/CBDCA(3週毎)外来03NSCLC	NSCLCに対する化学療法 3 weekly	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	パクリタキセル注射液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注用:AUC6 Day1
IN033	CPT11/CDDP(60)(3投1休)外来03NSCLC	進展型 day1,8,15:CPT11、day1:CDDP 28日目休薬完了	高度催吐性リスク	15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1
IN035	CBDCA/VP16(3週毎)外来03NSCLC	day1,2,3:VP16、day1:CBDC 21日目休薬完了	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	3	18	イリノテカン点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注用:AUC5 Day1
IN036	GEM(3投1休)外来03NSCLC	NSCLCに対する化学療法	軽度催吐性リスク	15	13	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
IN037	GEM/VNR(2投1休)外来03NSCLC	2投1休 3~6コース	軽度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ロゼウス静注用:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
IN038	GEM/CDDP(2投1休)外来03NSCLC	day1,8:GEM、day1:CDDP 21日目休薬完了	高度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン点滴静注用:80mg/m <sup>2</sup> Day1
IN040	amrubicin(3週毎)外来03NSCLC	day1-3:AMR(40mg/m <sup>2</sup> ) 21日目休薬完了	中等度催吐性リスク	3	18	カルセド注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3
IN041	3wPEM(3週毎)外来03NSCLC	3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注用:500mg/m <sup>2</sup> Day1
IN042	CDDP/VNR(2投1休)外来03NSCLC	進行NSCLC、day1,8:VNR、day1:CDDP 21日目休薬完了	高度催吐性リスク	8	13	ロゼウス静注用:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン点滴静注用:80mg/m <sup>2</sup> Day1
IN062	CDDP/PEM(3週毎)外来03NSCLC	3週ごと	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注用:75mg/m <sup>2</sup> Day1
IN078	CDDP/AMR(3週毎)外来03NSCLC	day1,2,3:AMR、day1:CDDP 21日目休薬完了	高度催吐性リスク	3	18	カルセド注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注用:60mg/m <sup>2</sup> Day1
IN100	Bevacizumab単独(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1Bev 3週毎 PDまで	最小度催吐性リスク	1	20	ベバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1

IN106	CBDCA+DTX（3週毎）外来03非小細胞肺癌	day1DTX、CBDCA 3週毎 6サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ドセタキセル点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
IN107	CBDCA+DTX+RT（4週毎）外来03非小細胞肺癌	DTX、CBDCA（day1,15）4週毎 計3クール繰り返す	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	15	13	ドセタキセル点滴静注液:30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC3 Day1 Day15
IN108	CBDCA+PEM(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1PEM、CBDCA 3週毎 6サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
IN109	CBDCA+PEM+Bev(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1CBDCA,PEM,Bev 3週毎, 6サイクル	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
IN110	CDDP+PEM+Bev(3週毎)外来03非小細胞肺癌	day1PEM,CDDP,Bev 3週毎, 6サイクル	高度催吐性リスク	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m <sup>2</sup> Day1
IN129	PEM/Bev維持療法(3週毎)外来03NSCLC	3週毎 PDまで	軽度催吐性リスク	1	20	ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1
IN130	CBDCA+S-1（3週毎）外来03NSCLC	3週毎 最大6クール day1夕-15朝:S-1	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
IN132	CDDP+S-1（5週毎）外来03NSCLC	5週毎 最大6クール day8:CDDP、day1-21:S-1	高度催吐性リスク	1	34	シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1
IN134	CDDP+S-1+RT(4週毎)外来03NSCLC	4週毎 最大2クール day1,8:CDDP、day1-14:S-1	高度催吐性リスク	8	20	シスプラチン点滴静注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
IN148	CBDCA+PTX+Bev(3週毎)外来03NSCLC	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	パクリタール注射液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注:15mg/kg Day1
IN155	CBDCA+nab-PAC（3週毎）外来03NSCLC	3週毎 [CBDCA:day1、nab-PAC:day1,8,15（毎週）]	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	15	6	アブラキサン点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
IN174	ナドカ(NGT)単独療法（3週毎d1-5）外来03小細胞肺癌	ナドカ:d1-5、3週毎 PDまで	軽度催吐性リスク	5	16	ハイカムチン:1mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
IN188	S-1+CDDP+RT(4週毎)外来03NSCLC	4週毎 最大4クール day1:CDDP、day1-14:S-1	高度催吐性リスク	1	27	シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1
IN189a	Nivolumab【2週毎】外来03非小細胞肺癌	進行非小細胞肺癌に対するnivolumab療法	最小度催吐性リスク	1	13	オプジーボ点滴静注液:240mg Day1
IN189b	Nivolumab【4週毎】外来03非小細胞肺癌	進行非小細胞肺癌に対するnivolumab療法 PDまで	最小度催吐性リスク	1	27	オプジーボ点滴静注液:480mg Day1
IN190	DTX+Ramucirumab療法（3週毎）入外共通03NSCLC	day1:サイラムザ10mg/kg、ドセタキセル60mg/m <sup>2</sup>	軽度催吐性リスク	1	20	サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1
IN197a	PEMBRO【3週毎】療法 外来03NSCLC	PDL1陽性の進行非小細胞肺癌に対するPEMBRO療法	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
IN197b	PEMBRO【6週毎】療法 外来03NSCLC	PDL1陽性の進行非小細胞肺癌に対するPEMBRO療法 PDまで	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
IN217	Atezolizumab療法（3週毎）入外共通03非小細胞肺癌		最小度催吐性リスク	1	20	テセントリク点滴静注:1200mg Day1
IN218	Durvalumab(NSCLC)療法（2週毎）外来03非小細胞肺癌	原則同時放射線化学療法後、non-PD症例に対して、42日以内に開始する。投与期間12ヶ月間まで。	最小度催吐性リスク	1	13	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1

IN229	CBDCA/PEM/Pembro(3週毎)入外共通03NonSq-NSCLC	day1Pembro、PEM、CBDCA 3週毎 4サイクル	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
IN230	CDDP/PEM/Pembro(3週毎)入外共通03NonSq-NSCLC	day1Pembro、PEM、CDDP (ジョーイトレション) 3週毎 4 サイクル	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
IN231	PEM/Pembro(3週毎)入外共通03NonSq-NSCLC	day1Pembro,PEM 3週毎 キ イトルーダ総投与数として最大 35コース	軽度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1
IN232	CBDCA/PTX/Pembro(3週毎)入外共通03Sq-NSCLC	day1 Pembro,PTX,CBDCA 3週 毎 4サイクル	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	パ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 注射液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
IN233	CBDCA/nab-PTX/Pembro(3週毎)入外共通03Sq-NSCLC	3週毎 [CBDCA、Pembro: day1、nab-PAC: day1,8,15 (毎週)]	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	15	6	アブラキサン点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 キイトルーダ点滴:200mg Day1
IN234	CBDCA/PTX/Bev/Atezo(3週毎)入外共通03NonSq-NSCLC	day1:Atezo,Bev,PTX,CBDCA 3週毎 最大 4コース	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	パ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 注射液「 <sup>®</sup> 」(規格なし):175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液「NK」(規格なし):AUC6 Day1 ベバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注1200mg20mL:1200mg Day1
IN235	Bev/Atezo(3週毎)入外共通03NonSq-NSCLC	day1: Bev、Atezo 3週毎 PDまで	最小度催吐性リスク	1	20	ベバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注1200mg20mL:1200mg Day1
IN278	CBDCA/nab-PTX/ATEZO(3週毎)外来03NonSq-NSCLC	3週毎 [CBDCA、ATEZO: day1、nab-PAC: day1,8,15 (毎週)]	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	15	6	アブラキサン点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1
IN279	CBDCA/PEM/ATEZO(3週毎)外来03NonSq-NSCLC	day1: ATEZO、PEM、CBDCA 3週毎 4サイクル	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1
IN281	CDDP/PEM/ATEZO(3週毎)外来03NonSq-NSCLC	day1ATEZO、PEM、CDDP (ジョーイトレション) 3週毎 4 サイクル	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1
IN282	PEM/ATEZO(3週毎)外来03NonSq-NSCLC	day1ATEZO,PEM 3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	テセントリク点滴静注:1200mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1
IN290	CBDCA/VP16/DURVA(3週毎)外来03SCLC	day1,2,3:VP16、 day1:CBDCA,DURVA 21日目 休薬完了	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	3	18	イト <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
IN291	CDDP/VP-16/DURVA(3週毎)外来03SCLC	day1 DURVA、VP-16、CDDP (ジョーイトレション) 3週毎 4 サイクル	高度催吐性リスク	3	18	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 イト <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注液:80mg/m <sup>2</sup> Day1
IN292	DURVA(SCLC)維持療法(4週毎)外来03小細胞肺癌	CBDCA or CDDP/VP- 16/DURVA療法 4コース終了 後の維持療法	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
IN295	【1 Cycle】NIVO/IPI/PTX/CBDCA療法 外来03NSCLC	【1cycle】【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維 持療法へ day1: NIVO,IPI,PTX,CBDCA	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	パ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 注射液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
IN296	【2 Cycle】NIVO/(IPI)/PTX/CBDCA療法 外来03NSCLC	【1cycle】【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維 持療法へ day15: NIVO,PTX,CBDCA	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	パ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 注射液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
IN297	【1 Cycle】NIVO/IPI/CBDCA/PEM療法 外来03NSCLC	【1cycle】【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維 持療法へ day1: NIVO,IPI,PEM,CBDCA	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
IN298	【2 Cycle】NIVO/(IPI)/CBDCA/PEM療法 外来03NSCLC	【1cycle】【2cycle】の順で1 クールのみ実施する。以降は維 持療法へ day15: NIVO,PEM,CBDCA	中等度催吐性リスク(特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1

IN299	【1 Cycle】NIVO/IPI/PEM/CDDP療法 外来03NSCLC	【1cycle】【2cycle】の順で1クールのみ実施する。以降は維持療法へ day1 : NIVO,IPI,PEM,CDDP	高度催吐性リスク	1	20	オブジーボ点滴静注液:360mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
IN300	【2 Cycle】NIVO/(IPI)/PEM/CDDP療法 外来03NSCLC	【1cycle】【2cycle】の順で1クールのみ実施する。以降は維持療法へ day15 : NIVO,PEM,CDDP	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
IN341	【術前】NIVO+CBDC+PTX療法 外来03 NSCLC	※最大3コース NSCLC (Non-Sq/Sq) day1 ; NIVO, CBDC, PTX	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 注射液:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
IN342	【術前】NIVO+CBDC+PEM療法 外来03 NSCLC	※最大3コース NSCLC (Non-Sq) day1 ; NIVO, CBDC, PEM	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
IN343	【術前】NIVO+CDDP+PEM療法 外来03 NSCLC	※最大3コース NSCLC (Non-Sq) day1 ; NIVO, CDDP, PEM	高度催吐性リスク	1	20	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 オブジーボ点滴静注液:360mg Day1
IN344	Trem+Durva+PEM+CBDC療法 外来03NSCLC(非扁平)	★4サイクル。以降は維持療法(Trem/Durva/PEM)へ day1 : Trem,Durva,PEM,CBDC	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 イ <sup>®</sup> 点滴静注:75mg Day1
IN345	Trem+Durva+PEM+CDDP療法 外来03NSCLC (非扁平)	★4サイクル。以降は維持療法(Trem/Durva/PEM)へ day1 : Trem,Durva,PEM,CDDP	高度催吐性リスク	1	20	ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 イ <sup>®</sup> 点滴静注:75mg Day1
IN346	Trem+Durva+PEM+CBDC/CDDP維持療法前半 外来03NSCLC	★1サイクル。以降は維持療法(Durva/PEM)へ day1 : Durva,PEM day29 : Trem,Durva,PEM	軽度催吐性リスク	29	27	ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day29 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 Day29 イ <sup>®</sup> 点滴静注:75mg Day29
IN347	Trem+Durva+PEM+CBDC/CDDP維持療法後半 外来03NSCLC	★PDまで。 day1 : Durva,PEM	軽度催吐性リスク	1	27	ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 点滴静注液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
IN348	Trem+Durva+nab-PTX+CBDC療法 外来03NSCLC	★4サイクル。以降は維持療法(Trem/Durva)へ day1 : Trem,Durva,nab-PTX,CBDC day8,15 : nab-PTX	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	イ <sup>®</sup> 点滴静注:75mg Day1 アブラキサン点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1
IN349	Trem+Durva+nab-PTX+CBDC維持療法前半 外来03 NSCLC	★1サイクル。以降は維持療法(Durva)へ day1 : Durva day29 : Trem,Durva	最小度催吐性リスク	29	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1 Day29 イ <sup>®</sup> 点滴静注:75mg Day29
IN350	Trem+Durva+nab-PTX+CBDC維持療法後半 外来03 NSCLC	★PDまで NSCLC (Non-Sq/Sq) day1 : Durva	最小度催吐性リスク	1	27	イミフィンジ点滴静注液:1500mg Day1