

造血器腫瘍レジメン

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
IN059	CHOP（2週毎）外来08悪性リンパ腫	ADM50mg/m2、 CPA750mg/m2、 VCR1.4mg/m2(max2mg/b)、 d1-5：PSL100mg 14日目休薬完了 d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準抛	1	13	水溶性プレドニン：100mg Day1 オンコピン注：1.4mg/m ² Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用：50mg/m ² Day1 エンドキサン注：750mg/m ² Day1
IN060	THP/COP（2週毎）外来08悪性リンパ腫	day1：THP-ADM、CPA、VCR、 PSL100mg(d1-5) 14日目休薬完了 d2-5：PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準抛	1	13	エンドキサン注：750mg/m ² Day1 水溶性プレドニン：100mg Day1 オンコピン注：1.4mg/m ² Day1 ピノルピン静注用：50mg/m ² Day1
IN099	BOR（1回分）外来08MM	1回分	最小度催吐性リスク	1	2	デキサート注射液：5ml Day1 ベルケイド注射用：1.3mg/m ² Day1
IN099	BOR（1回分）外来08MM	1回分	最小度催吐性リスク	1	2	デキサート注射液：5ml Day1 ベルケイド注射用：1.3mg/m ² Day1
IN117	VP（3週毎）外来08急性リンパ性白血病	3週毎 最大30クール	最小度催吐性リスク	1	20	水溶性プレドニン注：60mg/m ² Day1 オンコピン注：1.4mg/m ² Day1
IN118	MTX髄注（4W）外来08白血病・ML・がん性髄膜炎	4週毎（最大15クール） Total 4mL 注射器併用のことあり	最小度催吐性リスク	1	27	メソトレキセート注：15mg Day1 デキサート注射液（0.5mLアンプル）：2A Day1 生食注：3ml Day1
IN120	バンガム注（3週毎d1-2）外来08悪性リンパ腫	3週毎（day1-2） 骨髄抑制の回復を待って6～12サイクル繰り返す	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準抛	2	19	バンガム注塩酸塩点滴静注液：120mg/m ² Day1 Day2
IN135	ビダーザ皮下注（4週毎）外来08MDS	4週毎（day1-7）有効であれば継続	中等度催吐性リスク	7	21	ビダーザ注射用：75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
IN136	ビダーザ点滴（4週毎）外来08MDS	4週毎（day1-7）有効であれば継続	中等度催吐性リスク	7	21	ビダーザ注射用：75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
IN137	ベルケイド3時間療法（1回分）外来08MM	1回分	最小度催吐性リスク	1	2	デキサート注射液：5ml Day1 ベルケイド注射用：1.3mg/m ² Day1
IN138	ABVD（2週毎）外来08リンパ腫	2週毎 最大16コース	高度催吐性リスク	1	13	ドキシソルピシン塩酸塩注射用：25mg/m ² Day1 プレオ注射用：10mg/m ² Day1 エクザール注：6mg/m ² Day1 ダカルバジン注用：375mg/m ² Day1
IN154	ポテリジオ（毎週）外来08ATL/T細胞性リンパ腫	週1回で8回繰り返す。再投与可能。	最小度催吐性リスク	1	6	ポテリジオ点滴静注 20mg：1mg/kg Day1
IN164	GDP（2投1休）外来08悪性リンパ腫	最大16コース リツマチとの併用あり 救援化学療法	高度催吐性リスク	8	13	デキサート注射液：10ml Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点滴静注用：1000mg/m ² Day1 Day8 シスプラチン点滴静注：75mg/m ² Day1
IN181	アドセトリス（3週毎）外来08CD30陽性HL・ALCL	最大16クール	軽度催吐性リスク	1	20	アドセトリス点滴静注用：1.8mg/kg Day1
IN182	マブキャンパス（週3回）外来08慢性リンパ性白血病	再発又は難治性 1日1回3mg連日投与から開始→10mg連日投与→30mg週3回 投与開始から12週間まで	最小度催吐性リスク	5	2	マブキャンパス点滴静注：30mg Day1 Day3 Day5

IN190	mCyBorD療法（3週毎）外来08MM	最大8コース PN出現時には、ベルケイドをday1,8,15,22へ変更可（別レジメン）	中等度催吐性リスク	11	10	デキサート注射液:10ml Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイド注射用:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 エンドキサン注 :300mg/m ² Day1 Day8
IN194	KRd療法（1コース目）外来08再発難治性多発性骨髄腫	デキサメタゾン40mg : d1,8,15,22 カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² : d1,2 27mg/m ² : d8,9,15,16 レトリミド : d1-21 2コース以降別レジメン	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
IN195	KRd療法2~12コース 外来08再発難治性多発性骨髄腫	デキサメタゾン40mg : d1,8,15,22 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² : d1,2,8,9,15,16 レトリミド : d1-21（4週毎） 13コース以降別レジメン	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
IN196	KRd療法13コース以降 外来08再発難治性多発性骨髄腫	デキサメタゾン40mg : d1,8,15,22 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² : d1,2,15,16 レトリミド : d1-21（4週毎） 13コース以降別レジメン	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:10ml Day1 Day15 カイプロリス点滴静注用:27mg/m ² Day1 Day2 Day15 Day16
IN197	Kd療法（1コース目）外来08再発難治性多発性骨髄腫	デキサメタゾン20mg : d1,2,8,9,15,16,,22,23 カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² : d1,2 56mg/m ² : d8,9,15,16 2コース以降別レジメン	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:4ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液:1ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 カイプロリス点滴静注用:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
IN198	Kd療法（2コース目以降）外来08再発難治性多発性骨髄腫	デキサメタゾン20mg : d1,2,8,9,15,16,,22,23 カイプロリス点滴静注用:56mg/m ² : d1,2,8,9,15,16	軽度催吐性リスク	16	12	デキサート注射液:4ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液:1ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
IN203	FC療法（4週毎）入外共通08CLL/SLL	フルダラ静注用:30mg/m ² 、CPA250mg/m ² 28日目休薬完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	3	25	フルダラ静注用:30mg/m ² Day1 Day2 Day3 エンドキサン注:250mg/m ² Day1 Day2 Day3
IN205	ERd療法（1,2コース目）外来08再発難治性MM	デキサメタゾン28mg : d0,7,14,21 イリテニウム10mg/kg : d1,8,15,22 レトリミド : d1-21（4週毎） 3コース以降別レジメン	軽度催吐性リスク	22	6	デキサート注射液:2ml Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシチン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
IN206	ERd療法（3コース目以降）外来08再発難治性MM	デキサメタゾン28mg : d0,14 デキサメタゾン40mg : d8,22 イリテニウム10mg/kg : d1,15 レトリミド : d1-21（4週毎）	軽度催吐性リスク	15	13	デキサート注射液:2ml Day1 Day15 エムプリシチン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15
IN214	DLd療法（2回以降）入外共通08再発又は難治性MM	レトリミド（25mg/day day1-21）、デキサメタゾン20mg（day2のみ） 処方 D: 1~8週weekly,9~24週biweekly,25週以上4w	軽度催吐性リスク	1	6	デキサート注射液:6ml Day1 ダラザレックス点滴静注用:16mg/kg Day1
IN219	リツキシマブBS（day1）外来08CD20陽性B細胞性リンパ腫	day1レジメン CHOP、ハンダミド等との併用の場合あり	最小度催吐性リスク	1	0	リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1
IN220	リツキシマブBS+ハンダミド（4週毎d1-2）外来08リンパ腫	4週毎（day1-2） 6~8コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	2	26	リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ハンダミド塩酸塩点滴静注用:90mg/m ² Day1 Day2
IN221	R（リツキシマブBS）-CHOP（3週毎）外来08B細胞性リンパ腫	21日目休薬完了、day1、最大8コース d2-5 : PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	20	ソル・メドロール:125mg Day1 リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 オンコピン注 :1.4mg/m ² Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用:50mg/m ² Day1 エンドキサン注 :750mg/m ² Day1
IN222	R（リツキシマブBS）-THP-COP（2週毎）外来08リンパ腫	14日目休薬完了、day1、最大8コース d2-5 : PSL100mg処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	13	ソル・メドロール:125mg Day1 リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 オンコピン注 :1.4mg/m ² Day1 ピノルピン静注用:50mg/m ² Day1 エンドキサン注 :750mg/m ² Day1

IN223	ガザイバ (day1) 外来08CD20陽性濾胞性リンパ	day1のみの CHOP、ハンガムシ等と併用の場合あり (CHOP,CVP併用: 3週毎 ハンガムシ併用: 4週毎)	最小度催吐性リスク	1	0	ガザイバ点滴静注:1000mg Day1
IN228	Nivolumab (2週毎) 240mg/body入外共通13歳未満リンパ腫	再発難治性ホジキンリンパ腫に対するnivolumab療法【240mg/body】	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
IN238	Pembrolizumab 200mg 3週毎 入外共通08歳未満リンパ腫	Pembrolizumab 200mg/body 3週毎 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
IN273	Kd (once weekly)療法 (1kur目) 外来08再発難治性MM	デキサメタゾン40mg: d1,8,15,22 カイロリス20mg/m ² : d1 70mg/m ² : d8,15 2回以降別日	軽度催吐性リスク	15	13	カイプロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 カイプロリス点滴静注用:70mg/m ² Day8 Day15
IN274	Kd (once weekly)療法 (2kur目〜) 外来08再発難治性MM	デキサメタゾン40mg: d1,8,15,22 カイロリス 70mg/m ² : d1,d8,15	軽度催吐性リスク	15	13	カイプロリス点滴静注用:70mg/m ² Day1 Day8 Day15
IN277	イスタックス(3投1休) 外来08再発難治性末梢性T細胞リンパ腫	再発難治性末梢性T細胞リンパ腫 Romidepsin (day1,8,15 : 14mg/m ²) 4週毎	軽度催吐性リスク	15	13	イスタックス点滴静注用:14mg/m ² Day1 Day8 Day15
IN294a	EPd療法 (3回〜 50kg未満) 外来08再発難治性MM	DEX28mg: d0-1 40mg: d8,15,22 1日あたり20mg/kg: d1 1日あたり20mg/kg: d1-21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:2ml Day1 エムプリシティ点滴静注用:20mg/kg Day1
IN294b	EPd療法 (3回〜 50kg〜90kg) 外来08再発難治性MM	DEX28mg: d0-1 40mg: d8,15,22 1日あたり20mg/kg: d1 1日あたり20mg/kg: d1-21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:2ml Day1 エムプリシティ点滴静注用:20mg/kg Day1
IN294c	EPd療法 (3回〜 90kg超) 外来08再発難治性MM	DEX28mg: d0-1 28mg: d8,15,22 1日あたり20mg/kg: d1 1日あたり20mg/kg: d1-21 (4週毎)	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:2ml Day1 エムプリシティ点滴静注用:20mg/kg Day1
IN306a	【初回】リツキシマブ+ハンガムシ+ホライビ- (3w毎) 外来08リンパ腫	3週毎 (初回) 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	中等度催吐性リスク (特定薬剤) 準拠	3	18	リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ハンガムシ塩酸塩点滴静注用:90mg/m ² Day2 Day3 ポライビ-点滴静注用:1.8mg/kg Day2
IN306b	【2-6回目】リツキシマブ+ハンガムシ+ホライビ- (3週) 外来リンパ腫	3週毎 (2-6サイクル目) 外来再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	中等度催吐性リスク (特定薬剤) 準拠	2	19	ハンガムシ塩酸塩点滴静注用:90mg/m ² Day1 Day2 リツキシマブBS注:375mg/m ² Day1 ポライビ-点滴静注用:1.8mg/kg Day1
IN307b	Dara-VMP療法 (cycle 2〜9) 外来08多発性骨髄腫	2-9サイクル (7-54週) Dara16mg/kg、 α 2 μ 1.3mg/m ² 、アルタラ (経口) 9mg/m ² 、ゾレドリック (経口) 60mg/m ²	軽度催吐性リスク	29	13	デキサート注射液:6ml Day1 Day22 ペルケイド注射液:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 ダラザレックス点滴静注用:16mg/kg Day1 Day22
IN307c	Dara-VMP療法 (cycle 10〜) 外来08多発性骨髄腫	10サイクル (55週) ~ Dara16mg/kgを4週毎で継続	軽度催吐性リスク	1	27	デキサート注射液:6ml Day1 ダラザレックス点滴静注用:16mg/kg Day1
IN309	A+AVD (4週毎) (1回分) 外来08歳未満リンパ腫	4週毎 (day1, 15) 最大6コース (12回)	高度催吐性リスク	1	9	ドキシソルピシン塩酸塩注射液:25mg/m ² Day1 エクザール注 :6mg/m ² Day1 ダカルバジン注用:375mg/m ² Day1 アドセトリス点滴静注用:1.2mg/kg Day1

IN312	A-CHP（3週毎）外来08悪性リンパ腫	7ト*トリ1.8mg/kg、ADM50mg/m ² 、CPA750mg/m ² 、d1-5：PSL100mg 21日目休薬完了 8コースまで d2-5：PSL100mg 処方	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	20	ソル・メドロール 1.25 mg/V: 1V Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用: 50mg/m ² Day1 エンドキサン注 : 750mg/m ² Day1 アドセトリス点滴静注用: 1.8mg/kg Day1
IN321a	DCyBorD療法（C1、2）外来08原発性アミロイドーシス	1、2ケル目（4週毎）ダラキ1-0 1800mg、ベルケイト1.3mg/m ² 、エンドキサン300mg/m ² 、デキサゾン40mg/week	中等度催吐性リスク	23	5	デキサゾン注射液: 6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1 Day8 Day15 Day22 エンドキサン注 : 300mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイト注射用: 1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
IN321b	DCyBorD療法（C3-6）外来08原発性アミロイドーシス	3-6ケル目（4週毎）ダラキ1-0 1800mg（d1.15）、ベルケイト1.3mg/m ² 、エンドキサン300mg/m ² 、デキサゾン40mg/week	中等度催吐性リスク	22	6	デキサゾン注射液: 6ml Day1 Day15 ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1 Day15 ベルケイト注射用: 1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 エンドキサン注 : 300mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 デキサゾン注射液: 12ml Day8 Day22
IN321c	DCyBorD療法（C7-）外来08原発性アミロイドーシス	7ケル目以降（4週毎）ダラキ1-0 1800mg（d1）のみ	軽度催吐性リスク	1	27	ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1
IN327	Pola-CHP療法（3週毎）外来08DLBCL	未治療のDLBCL ホルタ1.8mg/kg、トリホリチン50mg/m ² 、エンドキサン750mg/m ² 、【リツキサブは別レジメで入力】	中等度催吐性リスク（特定薬剤）準拠	1	20	エンドキサン注 : 750mg/m ² Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用: 50mg/m ² Day1 ソル・メドロール: 1.25mg Day1 ポライビ点滴静注用: 1.8mg/kg Day1
IN334a	DKd療法（1-1目）外来08再発難治性多発性骨髄腫	Dara : d 1, 8, 15, 22 DEX20mg : d 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 カイロ 20mg/m ² : d 1, 2 56mg/m ² : d 8, 9, 15, 16	軽度催吐性リスク	22	6	デキサゾン注射液: 6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用: 20mg/m ² Day1 Day2 ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1 Day8 Day15 Day22 カイプロリス点滴静注用: 56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
IN334b	DKd療法（2-1目）外来08再発難治性多発性骨髄腫	Dara : d 1, 8, 15, 22 DEX20mg : d 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 カイロ 56mg/m ² : d 1, 2, 8, 9, 15, 16	軽度催吐性リスク	22	6	デキサゾン注射液: 6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用: 56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1 Day8 Day15 Day22
IN334c	DKd療法（3-6-1目）外来08再発難治性多発性骨髄腫	Dara : d 1, 15 DEX20mg : d 1, 2, 8, 9, 15, 16 40mg : d 22 カイロ 56mg/m ² : d 1, 2, 8, 9, 15, 16	軽度催吐性リスク	16	12	デキサゾン注射液: 6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用: 56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1 Day15
IN334d	DKd療法（7-1目以降）外来08再発難治性多発性骨髄腫	Dara : d 1 DEX20mg : d 1, 2, 8, 9, 15, 16 40mg : d 22 カイロ 56mg/m ² : d 1, 2, 8, 9, 15, 16	軽度催吐性リスク	16	12	ダラキユーロ配合皮下注: 1V Day1 デキサゾン注射液: 6ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイプロリス点滴静注用: 56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
IN352	IsaPd療法（1-1目）外来08再発難治性MM	Isa : d 1, 8, 15, 22 DEX40mg : d 1, 8, 15, 22（75歳以上の症例などではDEX50%に減量） ホルタミド : d 1-21内服	軽度催吐性リスク	22	6	サークルサ点滴静注: 10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサゾン注射液: 10ml Day1 Day8 Day15 Day22
IN353	IsaPd療法（2-1目以降）外来08再発難治性MM	Isa : d 1, 15 DEX40mg : d 1, 8, 15, 22（75歳以上の症例などではDEX50%に減量） ホルタミド : d 1-21内服	軽度催吐性リスク	15	13	サークルサ点滴静注: 10mg/kg Day1 Day15 デキサゾン注射液: 10ml Day1 Day15
IN354	IsaKd療法（1-1目）外来08再発難治性MM	Isa : d 1, 8, 15, 22 DEX20mg : d 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 カルフィルミグ 20mg/m ² : d 1, 2 56mg/m ² : d 8, 9, 15, 16	軽度催吐性リスク	22	6	カイロ点滴静注用: 20mg/m ² Day1 Day2 サークルサ点滴静注: 10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサゾン注射液: 5ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 カイロ点滴静注用: 56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
IN355	IsaKd療法（2-1目以降）外来08再発難治性MM	Isa : d 1, 15 DEX20mg : d 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 カルフィルミグ 56mg/m ² : d 1, 2, 8, 9, 15, 16	軽度催吐性リスク	16	12	カイロ点滴静注用: 56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 サークルサ点滴静注: 10mg/kg Day1 Day15 デキサゾン注射液: 5ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16

IN356	Isa+d療法（1回-1回）外来08再発難治性MM	Isa : d 1,8,15,22 DEX40mg : d 1,8,15,22 (75歳以上の症例などではDEX50%に減量)	軽度催吐性リスク	22	6	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液:10ml Day1 Day8 Day15 Day22
IN357	Isa+d療法（2回-1回以降）外来08再発難治性MM	Isa : d 1,15 DEX40mg : d 1,8,15,22 (75歳以上の症例などではDEX50%に減量)	軽度催吐性リスク	15	13	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15 デキサート注射液:10ml Day1 Day15
IN358	Isa単剤療法（1回-1回）外来08再発難治性MM	Isa : d 1,8,15,22	軽度催吐性リスク	22	6	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
IN359	Isa単剤療法（2回-1回以降）外来08再発難治性MM	Isa : d 1,15	軽度催吐性リスク	15	13	サークルサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15
IN363	【1回-1回】I ¹⁷ リタマ [®] 療法【4週毎】外来08NHL	I ¹⁷ リタマ [®] : day1,8,15,22 PDまで	最小度催吐性リスク	22	6	エプキンリ皮下注4mg :0.16mg Day1 エプキンリ皮下注4mg :0.8mg Day8 エプキンリ皮下注48mg :1V Day15 Day22
IN364	【2-3回-1回】I ¹⁷ リタマ [®] 療法【4週毎】外来08NHL	I ¹⁷ リタマ [®] : day1,8,15,22 PDまで	最小度催吐性リスク	22	6	エプキンリ皮下注48mg :1V Day1 Day8 Day15 Day22
IN365	【4-9回-1回】I ¹⁷ リタマ [®] 療法【4週毎】外来08NHL	I ¹⁷ リタマ [®] : day1,15 PDまで	最小度催吐性リスク	15	13	エプキンリ皮下注48mg :1V Day1 Day15
IN366	【10回-1回以降】I ¹⁷ リタマ [®] 療法【4週毎】外来 08NHL	【4週毎】I ¹⁷ リタマ [®] : day1 PDまで	最小度催吐性リスク	1	27	エプキンリ皮下注48mg :1V Day1
IN378	I ¹⁷ フォルタ [®] 療法【7週毎】外来08PTCL	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫 day1,8,15,22,29,36 PDまで	最小度催吐性リスク	36	13	ゾフォルタ注射液20mg:30mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36