

共通事項

【前投薬】

抗がん剤	前投薬
パクリタキセル	ポララミン注 5mg 点滴
	ファモチジン注射液20mg 1A 点滴
	デキサート注射液 ※パクリタキセル投与量に応じて
ジェブタナ	ポララミン注 5mg ゆっくりIV
	ファモチジン注射液20mg 1A ゆっくりIV
	デキサート注射液6.6mg ゆっくりIV
サイラムザ	ポララミン注 5mg 点滴
アービタックス	ポララミン注 5mg 点滴
	デキサート注射液6.6mg 点滴
トーリセル	レスタミンコーワ錠10mg 5錠 経口内服
リツキシマブ	ソル・メドロール静注用125mg 点滴
	ポララミン注 5mg 点滴
ポテリジオ	ソル・メドロール静注用125mg 点滴
	ポララミン注 5mg 点滴
アドセトリス	ソル・メドロール静注用125mg 点滴
	ポララミン注 5mg 点滴
ダラザレックス	デキサート注射液20mg 点滴 (治療目的も兼ねる)
	ポララミン注 5mg 点滴
	アセリオ静注液1000mg 点滴
エムプリシティ	ポララミン注 5mg 点滴
	ファモチジン注射液20mg 1A 点滴
	アセトアミノフェン500mg 内服
ガザイバ	ソル・メドロール静注用125mg 点滴
	ポララミン注 5mg 点滴
	アセトアミノフェン500mg 内服
ダラキューロ	デキサート注射液20mg 点滴 (治療目的も兼ねる)
	ポララミン注 5mg 点滴
	アセトアミノフェン1000mg 内服
ポライビー	ソル・メドロール静注用125mg 点滴
	ポララミン注 5mg 点滴
	アセトアミノフェン500mg 内服

【PEM副作用対策】

薬剤	投与量及び投与期間
①葉酸投与	パンビタン末 1g 1×内服。 初回投与 1週間前から開始。PEM中止または終了する場合には、最終投与から22日目まで投与。
②VitB12投与	メコバラミン注射液 1mg筋注。 初回投与 1週間前までに1mgを筋肉内投与。以後9週ごとに投与。

【プララトレキサート副作用対策】

薬剤	投与量及び投与期間
①葉酸投与	パンビタン末 2g 1×内服。 初回投与 7日以上前から開始。プララトレキサート投与終了日から30日間まで投与。
②VitB12投与	メコバラミン注射液 1mg筋注。 初回投与 7日以上前に1mgを筋肉内投与。以降8～10週毎に投与。
③ホリナート投与	プララトレキサート投与後24時間目よりホリナート錠を下記のとおり8時間間隔で6回投与。 (1週目) ホリナート錠25mg/回 (2週目以降) 前回投与後、口内炎がなかった場合ホリナート錠15mg/回、前回投与後、口内炎が発現した場合ホリナート錠25mg/回