

泌尿器腫瘍レジメン

2024年10月最終

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
URO02	GEM (GEM/CDDPのday15) 外来07尿路上皮癌	(GEM/CDDP) のday15のみ 7日目休業完了	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1
URO04	IL-2/105万U (週3回) 外来07腎癌	週3回(月、水、金) 投与 7日 目休業完了	最小度催吐性リスク	5	2	イムネース注35万U/B:105万U Day1 Day3 Day5
URO05	3wDTX/PSL外来07前立腺癌	DTX: 3週毎 PSL: 治療中常時 内服	軽度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m ² Day1
URO06	IL-2/105万U (1回分) 外来07腎癌	週3回(月、水、金) 投与の1回 分 1日目休業完了	最小度催吐性リスク	1	0	イムネース注35万U/B:105万U Day1
URO07	Weeklyトリーセル (毎週) 外来07腎癌	根治切除不能または転移性腎癌 毎週投与	最小度催吐性リスク	1	6	トリーセル点滴静注液:25mg Day1
URO09	BEP (d8,15) 外来07精巣腫瘍	最大4コース 3週毎 day1-5は 別レジメン	最小度催吐性リスク	8	6	ブレオ注射用:30mg Day1 Day8
URO11	MVAC (d15,22) 外来07尿路上皮癌	4週毎 day1-2は別レジメン	最小度催吐性リスク	8	6	エクザール注:3mg/m ² Day1 Day8 メントレキセート注:30mg/m ² Day1 Day8
URO14	カバジタキセル (3週毎) 外来07去勢抵抗前立腺癌	PSL: 治療中常時内服	軽度催吐性リスク	1	20	ジェブタナ点滴静注:25mg/m ² Day1
URO18a	Nivolumab 【2週毎】 外来07進行性腎細胞癌	PDまで	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
URO18b	Nivolumab 【4週毎】 外来07進行性腎細胞癌	PDまで ver.480mg/4w	最小度催吐性リスク	1	27	オブジーボ点滴静注液:480mg Day1
URO20a	アム*トリス*マ* 【200】 療法3週毎外来07進行性尿路上皮癌	膀胱癌、腎盂尿管癌 3週毎	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
URO20b	アム*トリス*マ* 【400】 療法6週毎外来07進行性尿路上皮癌	膀胱癌、腎盂尿管癌 6週毎	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
URO21	Nivolumab+Ipilimumab(3週)入外共通07進行性腎細胞癌	4コースまで、終了後は Nivolumab単独療法へ	最小度催吐性リスク	1	20	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
URO22a	Pembro(200)/Axitinib療法3週毎 外来07進行性腎細胞癌	腎細胞癌 キイトルーダ: day1 3週毎 インライタを併用 (1日2 回 初回量5mg/回 増減基準あり)	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
URO22b	Pembro(400)/Axitinib療法6週毎 外来07進行性腎細胞癌	腎細胞癌 キイトルーダ: day1 6週毎 インライタを併用 (1日2 回 初回量5mg/回 増減基準あり)	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1
URO23	Avelumab/Axitinib療法2週毎 外来07進行性腎細胞癌	腎細胞癌 バベンチオ: day1 2 週毎 インライタを併用 (1日2回 初回量5mg/回 増減基準あり)	最小度催吐性リスク	1	13	バベンチオ点滴静注:10mg/kg Day1
URO25	Avelumab療法2週毎 外来07進行性尿路上皮癌	進行性尿路上皮癌 バベンチオ: day1 2週毎 PDまで	最小度催吐性リスク	1	13	バベンチオ点滴静注:10mg/kg Day1
URO26a	【2週毎】 ニ*ム*マ* + ア*ム*トリス*マ* 療法外来 転移性腎細胞癌	ニ*ム*マ* 40mg/日連日内服	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
URO26b	【4週毎】 ニ*ム*マ* + ア*ム*トリス*マ* 療法外来 転移性腎細胞癌	ニ*ム*マ* 40mg/日連日内服	最小度催吐性リスク	1	27	オブジーボ点滴静注液:480mg Day1
URO27	エ*ル*セ*ブ* 療法 (1回分) 外来 07 進行性尿路上皮癌	3投 1休の1回分 (day1、8、15 に投与し、day22は休業)	軽度催吐性リスク	1	6	パドセブ点滴静注用:1.25mg/kg Day1
URO28a	【3週毎】 レ*バ*チ*コ* + ア*ム*トリス*マ* 200mg 外来07腎細胞癌	レ*バ*チ*コ* 20mg/day連日内服、 ア*ム*トリス*マ* 200mg/body 3 週毎	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
URO28b	【6週毎】 レ*バ*チ*コ* + ア*ム*トリス*マ* 400mg 外来07腎細胞癌	レ*バ*チ*コ* 20mg/day連日内服、 ア*ム*トリス*マ* 400mg/body 6 週毎	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1

URO29a	ニボルマブ療法【2週毎】外来07尿路上皮癌	尿路上皮癌の術後補助療法 投与期間は12ヶ月まで	最小度催吐性リスク	1	13	オブジーボ点滴静注液:240mg Day1
URO29b	ニボルマブ療法【4週毎】外来07尿路上皮癌	尿路上皮癌の術後補助療法 投与期間は12ヶ月まで	最小度催吐性リスク	1	27	オブジーボ点滴静注液:480mg Day1
URO30a	【3週毎】 ¹²⁵ I放射線療法(200mg) 外来07腎癌術後	腎細胞癌の術後補助療法 3週毎術後1年間	最小度催吐性リスク	1	20	キイトルーダ点滴:200mg Day1
URO30b	【6週毎】 ¹²⁵ I放射線療法(400mg) 外来07腎癌術後	腎細胞癌の術後補助療法 6週毎術後1年間投与	最小度催吐性リスク	1	41	キイトルーダ点滴:400mg Day1