

## 乳がんレジメン

2024年10月最終

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
IN020	VNR（2投1休）外来04乳癌	（入院・外来）2投1休 21日目 休業完了	最小度催吐性リスク	8	13	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
IN063	PTX（3投1休）外来04乳癌	day1,8,15を4週繰り返す	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
IN064	DTX75mg（3週毎）外来04乳癌	day1を3~4週ごと繰り返す	中等度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1
IN070	weeklyPTX（1回分）外来04乳癌	週1回投与	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1
IN071	B/TC順入替（DTX/CPA）（3週毎）外来04乳癌	3週毎	中等度催吐性リスク	1	20	エンドキサン注:600mg/m <sup>2</sup> Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1
IN072	（初回）3wHER8mg外来04乳癌	初回triweeklyHER（トラスツマブ） （8mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	20	トラスツマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
IN073	3wHER6mg外来04乳癌	乳癌術後 3wHER（トラスツマブ） （6mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	20	トラスツマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
IN074	（初回）wHER4mg外来04乳癌	初回weeklyハーセプチン（トラスツマブ） （4mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	6	トラスツマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1
IN075	wHER2mg外来04乳癌	再発進行乳癌weeklyハーセプチン （トラスツマブ）（2mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	6	トラスツマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1
IN076	2wHER外来04乳癌	再発進行乳癌 2 wHER （4mg/kg）	最小度催吐性リスク	1	13	トラスツマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1
IN086	GEM/PTX（2投1休）外来04乳癌	day1,8を3週毎繰り返す。2クール目 から"投与量"減量可。	軽度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1
IN091	VNR（2投1休）/wHER外来04乳癌	VNR：2投1休、HER：weekly 21日目休業完了	最小度催吐性リスク	15	6	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 トラスツマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1 Day8 Day15
IN092	VNR/HER（1回分）入院04乳癌	VNR：2投1休、HER：weeklyの 1回分のみ 7日目休業完了	最小度催吐性リスク	1	6	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1
IN093	GEM（2投1休）外来04乳癌	2投1休	軽度催吐性リスク	8	13	ゲムシタピン点滴静注用：1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
IN094	GEM（1回分）外来04乳癌	2投1休の1回分のみ	軽度催吐性リスク	1	6	ゲムシタピン点滴静注用：1250mg/m <sup>2</sup> Day1
IN097	VNR（1回分）外来04乳癌	（入院・外来）2投1休の1回分のみ 7日目休業完了	最小度催吐性リスク	1	6	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1
IN124	ハラヴェン（2投1休）外来04乳癌	3週毎（day1,8投与）手術不能 又は再発乳癌	軽度催吐性リスク	8	13	ハラヴェン静注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
IN125	FEC100_div（3週毎）外来04乳癌	3週毎	高度催吐性リスク	1	20	エンドキサン注：500mg/m <sup>2</sup> Day1 エビルピシン塩酸塩注射液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:500mg/m <sup>2</sup> Day1
IN126	FEC75_div（3週毎）外来04乳癌	3週毎	高度催吐性リスク	1	20	エンドキサン注：500mg/m <sup>2</sup> Day1 エビルピシン塩酸塩注射液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:500mg/m <sup>2</sup> Day1
IN127	ハラヴェン（1回分）外来04乳癌	2投1休の1回分 手術不能又は 再発乳癌	軽度催吐性リスク	1	6	ハラヴェン静注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1
IN149	A C点滴【ADM/CPA】（3週毎）外来04乳癌	3~4週毎に繰り返す	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF	1	20	ドキシルピシン塩酸塩注射液:60mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注:600mg/m <sup>2</sup> Day1

IN150	E C点滴 [EPI/CPA] (3週毎) 外来04乳癌	3~4週毎に繰り返す	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF	1	20	エビルピシン塩酸塩注射液:90mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注:600mg/m <sup>2</sup> Day1
IN186	TC/Tmab療法 (Tmab初回) (3週毎) 外来04乳癌	3週毎	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF	1	20	エンドキサン注 :600mg/m <sup>2</sup> Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
IN187	TC/Tmab療法 (Tmab2回目以降) (3週毎) 外来04乳癌	3週毎	中等度催吐性リスク	1	20	エンドキサン注 :600mg/m <sup>2</sup> Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
IN330	PEMBRO+PTX+CBDCA (3週ごと) 外来04乳癌	day1,8,15:PTX, day1: CBDCA、PEMBRO 21日 目休薬完了 4コースまで	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	15	6	キイトルーダ点滴:200mg Day1 パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC5 Day1
IN331	PEMBRO+EC [EPI/CPA] 療法 (3週毎) 外来04乳癌	術前化学療法 3週毎 4コースまで	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF	1	20	エビルピシン塩酸塩注射液:90mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 :600mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴静注用:200mg Day1
SUR02	G T 8 0 weekly (2投1休) 外来04乳癌	day1,8を3週毎繰り返す:2投1休 (PTX+GEM)	軽度催吐性リスク	8	13	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
SUR03	アブラキサン (3週毎) 外来04乳癌	3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	アブラキサン点滴静注用:260mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR04	wPTX+HER (2回目以降) 外来04乳癌	週1回投与 2回目以降	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:2mg/kg Day1
SUR05	パ→イ+H-D(初回)(3週毎)外来04進行・再発乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性進行・再発乳癌	中等度催吐性リスク	1	20	パージェタ点滴静注:840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR06	パ→イ+H-D(2回目以降)(3週毎)外来04進行・再発乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性進行・再発乳癌	中等度催吐性リスク	1	20	パージェタ点滴静注:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR07	T C b (3週毎) 外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1
SUR09	T C b H (2回目以降) (3週毎) 外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC6 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
SUR10	カ→イ+ (3週毎) 外来04進行・再発乳癌	3週毎 HER2陽性の手術不能又は再発乳癌 (トラスツズマブ) 及び特例系の既治療例	軽度催吐性リスク	1	20	カドサイラ点滴静注用(規格なし):3.6mg/kg Day1
SUR11	PTX+Bv (4週毎) 外来04進行・再発乳癌	PTX : d1,8,15 Bv : d1,15 PDまで	軽度催吐性リスク	15	13	ベシズマブBS点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注射液:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
SUR12	DTX+HER (初回) (3週毎) 外来04乳癌	術後乳癌は最大4ヶ月まで 進行・再発乳癌はPDまで	中等度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
SUR13	DTX+HER (2回目以降) (3週毎) 外来04乳癌	術後乳癌は最大4ヶ月まで 進行・再発乳癌はPDまで	中等度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
SUR14	トキソール半剤療法 (3週毎) 外来04軟部腫瘍	最大6ヶ月 進行性軟部腫瘍	高度催吐性リスク	1	20	ドキシフルピシン塩酸塩注射液:75mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR15	CBDCA+GEM (2投1休) 外来04乳癌	3週毎 (day1,8) PDまで 進行性リアクタイル乳癌	中等度催吐性リスク 準拠	8	13	カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8

SUR16	dose-denseEC療法（2週毎）外来04乳癌	最大4コース	高度催吐性リスク day2-4 経口DEX OFF	1	13	エビルピシン塩酸塩注射液:90mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注 :600mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR17	wPTX+Pmab+Tmab(初回)（3週毎）外来04進行・再発乳癌	day1 : Pmab(840mg/body) Tmab(8mg/kg) PTX(80mg/m <sup>2</sup> ) day8,15は別レジメン	軽度催吐性リスク	1	6	バージェタ点滴静注:840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR18	wPTX+Pmab+Tmab(2回目以降3週毎)外来04進行・再発乳癌	day1 : Pmab(420mg/body) Tmab(6mg/kg) PTX(80mg/m <sup>2</sup> ) day8,15は別レジメン	軽度催吐性リスク	1	6	バージェタ点滴静注:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR19	wPTX+HER（初回）外来04乳癌	週1回投与 初回	軽度催吐性リスク	1	6	パクリタキセル注射液:80mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:4mg/kg Day1
SUR20	dose-dense PTX（2週毎）外来04乳癌	EC又はAC後4~6J-1 day2以降にゲマスタ併用	軽度催吐性リスク	1	13	パクリタキセル注射液:175mg/m <sup>2</sup> Day1
SUR22	T C b HP（初回）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5.5 Day1 バージェタ点滴静注:840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
SUR23	T C b HP（2回目以降）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 最大6コース	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	ドセタキセル点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC5.5 Day1 バージェタ点滴静注:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
SUR24	ATEZO/nab-PTX療法 外来04乳癌	トリプルネガティブ PL-D1陽性の手術不能又は再発乳癌 ATEZO : day1,15 nab-PTX : day1,8,15	軽度催吐性リスク	15	13	アブラキサン点滴静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 デセントロク点滴静注用:840mg Day1 Day15
SUR25	HAL-Pmab/Tmab(初回)(3週毎)外来04進行・再発乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性進行・再発乳癌 P-mab/T-mab : day1 HAL : day1,8	軽度催吐性リスク	8	13	バージェタ点滴静注:840mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 ハラヴェン静注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
SUR26	HAL-Pmab/Tmab(2回目~)(3週毎)外来04進行・再発乳癌	3週毎 PDまで HER2陽性進行・再発乳癌 P-mab/T-mab : day1 HAL : day1,8	軽度催吐性リスク	8	13	バージェタ点滴静注:420mg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 ハラヴェン静注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
SUR27	エトルセ（3週毎）外来04進行・再発乳癌	3週毎 化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌（標準的な治療が困難な場合に限定）	高度催吐性リスク	1	20	エンハーツ点滴静注用:5.4mg/kg Day1
SUR28	Pembro/GEM/CBDCA(3週毎)入外共通04乳癌	day1Pembro、CBDCA、GEM day8 CBDCA、GEM 3週毎	中等度催吐性リスク 準拠	8	13	ゲムシタピン点滴静注用 :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴:200mg Day1
SUR29	フェスコ皮下注IN（初回）（3週毎）外来04乳癌	3週毎 術前・術後薬物療法の場合は12ヶ月まで HER2陽性乳癌	最小度催吐性リスク	1	20	フェスコ配合皮下注 I N 15mL/V:1V Day1
SUR30	フェスコ皮下注MA(2回目以降)(3週毎)外来04乳癌	3週毎 術前・術後薬物療法の場合は12ヶ月まで HER2陽性乳癌	最小度催吐性リスク	1	20	フェスコ配合皮下注 MA 10mL/V :1V Day1